

کلین گارد ۱٪



بیماری ورم پستان به دلیل اثرات بسیار مخرب و وسیع بر کمیت و کیفیت شیر، افزایش هزینه های درمان، آلوده شدن شیر به انواع آنتی بیوتیک ها، حذف گاوها و مستعد شدن دامها در ابتلا به انواع بیماری ها، همواره یکی از مهمترین مشکلات پیش روی صنعت گاوداری است و پیشگیری از آن بسیار آسان تر و مقرون به صرفه تر از درمان گاوهای مبتلا می باشد . در حال حاضر **کلین گارد** یکی از بهترین و موثرترین محصولات برای مراقبت و پیشگیری از ابتلای دام ها به ورم پستان بوده که موجب بهبود کیفیت بهداشتی شیر نیز می گردد. فرمولاسیون این محصول به گونه ای است که حداقل ۱ درصد ید فعال در محلول آزاد می نماید. تاثیر قاطعانه و سریع روی انواع میکروب های ایجاد کننده ورم پستان از قبیل باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، ویروس ها و قارچ ها و نابودسازی آنها از ویژگی های بارز این محصول است. همچنین در ساخت این محصول از ترکیبات مختلف برای التیام و بازسازی بافت سرپستانک ها استفاده شده است .

قدرت میکروب کشی بسیار بالا و سریع 

مراقبت و التیام بافت سرپستان 

ویسکوزیته و غلظت مناسب 

قدرت ماندگاری مناسب روی پستان تا چندین دقیقه بعد از مصرف 

پایداری محصول تا چندین ماه بعد از تولید 

استفاده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه در ساخت محصول 



روش مصرف :

بلافاصله بعد از اتمام هر بار شیردوشی، کل سرپرستانک را با استفاده از فنجانک های مخصوص (تیت کاپ) در محلول کلین گارد ۱٪ غوطه ور نمایید و اجازه دهید تا خشک شود. همیشه از محلول کلین گارد تازه استفاده کنید. اگر محلول داخل فنجانک کثیف و آلوده شد، باقیمانده آنرا بیرون بریزید و هرگز دوباره استفاده نکنید. از استفاده مجدد یا بازگرداندن مجدد محلول استفاده شده به ظرف اصلی خودداری کنید. با اعمال مدیریت مناسب از جمله خوراک ریختن در آخر، از دراز کشیدن گاو بلافاصله بعد از خروج از شیردوشی جلوگیری کنید. برای جلوگیری از آلودگی شیر به مواد ضد عفونی کننده، درست قبل از شیردوشی بعدی سرپرستانک ها را به طور کامل با آب بشویید. برای پیشگیری از ورم پستان در دوره خشکی و اوایل دوره شیردهی، در هفته اول دوره خشکی به طور روزانه از کلین گارد استفاده شود. همچنین از چند روز قبل از زایمان، استفاده روزانه کلین گارد را شروع نمایید.



شرایط نگهداری :

در انبار خنک و سایه و ظروف اصلی در بسته نگداری شود. از یخ زدگی و انجماد محصول جلوگیری نمایید.

موارد احتیاط :

از تماس با چشم جلوگیری نمایید. استفاده طولانی مدت ممکن است باعث تحریک چشم یا پوست شود، لذا در هنگام کار با این محصول از دستکش پلاستیکی، عینک یا محافظ صورت استفاده گردد.

کمک های اولیه :

چشم ها: بلافاصله با مقدار زیادی آب تمیز بشویید. لنزهای تماسی را بردارید به مدت ۱۵ دقیقه شستشو را ادامه دهید و پلک ها را از هم باز نگه دارید تا از شستشوی کل چشم اطمینان حاصل کنید. پوست: بلافاصله با مقدار زیادی آب و صابون کاملاً بشویید. در صورت بلعیده شدن، شخص را وادار به استفراغ نکنید. ابتدا دهان را شستشو و سپس ۱ یا ۲ لیوان بزرگ آب بنوشید و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.



دفتر مرکزی: تهران- کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان شهید محمودی پوری، پلاک ۵، طبقه دوم